

CHẤP (CHALAZION)

I. NGUYÊN NHÂN:

- Do bít lỗ tuyến bã (Meibomius, Zeis) ứ đọng chất bã gây bội nhiễm.
- Thường có cơ địa mụn trứng cá, viêm da.

II. LÂM SÀNG:

- Cảm giác nặng nề mi mắt, khi nhắm mắt thấy gò lên một khối tròn, không đau, khối tròn nằm trong bản sụn.
- Tái phát thường xuyên, tuy nhiên phải loại trừ carcinoma tuyến mebomian và carcinoma tế bào đáy.

LỆO

I. NGUYÊN NHÂN: nhiễm trùng nang mi do Staphylococcus.

II. LÂM SÀNG: sưng đau ngay bờ mi, sau đó tụ mủ dạng absces.

III. ĐIỀU TRỊ CHUNG:

1. Kháng sinh toàn thân
 - Amoxicilline: 50mg/kg/ngày (uống)
 - Cephalexin: 50mg/kg/ngày (uống)
2. Kháng viêm toàn thân :
Dexamethason 0,5mg/kg/ngày (uống)
3. Kháng sinh + kháng viêm tại chỗ:
 - Chloramphenicol + dexamethason
 - Tobramycin + dexamethason.
4. Rửa lấy mủ, nạo lấy sạch bao nang
Trường hợp tái phát nhiều lần phải kiểm tra xem bệnh nhân có tiểu đường hay suy giảm miễn dịch