

VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI KHUẨN

I. NGUYÊN NHÂN:

Do chấn thương mắt, dị vật, sau viêm kết mạc điều trị không đúng, dùng thuốc nhỏ có corticoide không đúng chỉ định.

II. LÂM SÀNG:

- Mắt cộm xồn như có dị vật trong mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt sống, co quắp mi, đau nhức mắt, thị lực giảm tùy theo mức độ tổn thương.
- Mi sưng, kết mạc đỏ, cương tụ rìa giác mạc.
- Giác mạc có vết loét trắng, thâm lậu quanh vết loét, bắt màu Flourescein
- Tiền phòng có thể đục, có mũ đọng phía dưới.

III. CẬN LÂM SÀNG:

Lấy bệnh phẩm vết loét lm

- Soi tươi
- Cây - Làm kháng sinh đồ.

IV. ĐIỀU TRỊ:

- Loét nông : nhỏ kháng sinh tại chỗ 6-10 lần/ngày (collyre Tobrex hoặc Cebemyxine hoặc Oflovid...)
- Loét sâu :
 - + Cần dùng kháng sinh phổ rộng, toàn thân.
 - + Thuốc uống giảm đau (paracetamol).
 - + Kháng sinh tại chỗ.
 - + Cần nhỏ thêm collyre Atropin để mắt nghỉ ngơi.

V. PHÒNG NGỪA:

- Cần trọng trọng lao động, sinh hoạt.
- Không tự ý nhỏ thuốc khi mắt đau, đỏ.